Roteiro 7b - Colisões

Leitura Recomendada

Moysés Seções 9.3-9.7 (ou Y& F Capítulo 8)

Questões

- Complete a seguinte afirmação: o momento linear (momentum) será conservado numa colisão de dois corpos se, e somente se,
 - A força externa resultante sobre o sistema de dois corpos for zero
 - A colisão for elástica
 - A energia cinética do sistema se conservar
 - Ambos os corpos ficarem em repouso após a colisão
 - As forças internas do sistema de dois corpos se cancelarem em pares ação-reação.
- Uma partícula de massa m_1 com velocidade de módulo v , choca-se frontalmente com uma outra de massa m_2 . Após a colisão, m_2 possui velocidade de módulo v_2 . A massa m_1 , chocando-se com a mesma velocidade de módulo v com uma partícula de massa m_3 , faz com que esta adquira uma velocidade de módulo v_3 . Os choques são elásticos e as massas m_2 e m_3 estão inicialmente em repouso. Calcule m_1 e v em termos de m_2 , m_3 , v_2 e v_3
- Um neutron de massa m_n e velocidade v_{ni} sofre uma colisão elástica com um núcleo de Carbono de massa m_C inicialmente em repouso. Quais são as velocidades finais do neutron e do núcleo de Carbono? Qual a fração de energia cinética perdida pelo neutron?

7. (P2 - 2017/1) Uma partícula de massa m desloca-se sobre uma mesa horizontal, sem atrito, com velocidade de módulo v_0 . Num certo instante ela se desintegra espontaneamente em três fragmentos de massas $m/6$, $m/2$ e $m/3$ como mostrado na figura. O módulo da velocidade do fragmento de massa $m/3$ é igual àquele de massa $m/2$, ao passo que o fragmento de massa $m/6$ segue a mesma direção e sentido da velocidade original da partícula. Qual das quantidades associadas ao sistema de massa m a seguir não se conserva no processo de desintegração?

- (a) Energia cinética
 (b) Momento Linear
 (c) Velocidade da posição do centro de massa
 (d) Massa total.
8. (P1 - 2019/1) Uma pequena esfera de massa m desliza ao longo do eixo x em uma mesa horizontal sem atrito e colide elasticamente, frontalmente, com uma outra esfera, de massa $M > m$, que estava inicialmente em repouso (a colisão é unidimensional). O gráfico abaixo mostra a posição da esfera de massa m em função do tempo até o instante da colisão t_c , que ocorre na posição x_c (linha sólida). Qual a reta tracejada indicada no gráfico que representa a evolução da posição da esfera de massa m após a colisão?

(a) 5	(d) 3	(g) 7
(b) 1	(e) 4	(h) 8
(c) 2	(f) 6	

9. Um carro de 1200 kg dirige para leste quando, num cruzamento, um caminhão de 3000 kg dirigindo na direção norte a 50 km/h colide com o carro, de forma que os dois saem juntos após a colisão formando um ângulo de 59° com a direção inicial do carro. O motorista do caminhão acusa o do carro, dizendo que ele estava acima do limite permitido de 80 km/h. Calcule a velocidade inicial do caminhão e verifique se essa afirmação é verdadeira.
10. Em uma colisão, uma bola de bilhar deslocando-se a uma velocidade de 2,2 m/s atinge outra idêntica em repouso. Após a colisão uma delas tem velocidade de 1,1 m/s fazendo um ângulo de 60° com a linha original de movimento.
- (a) Qual a velocidade da outra bola?
- (b) A colisão é elástica?
11. Duas pequenas bolas, que podem ser consideradas como partículas, estão sobre uma superfície horizontal sem atrito. Inicialmente, para um referencial em repouso, a bola 1 de massa $m_1 = m$ se movimenta com velocidade $\vec{v}_1 = v_0 \hat{i}$ em um dado sistema de coordenadas. A bola 2 de massa $m_2 = 2m$ está inicialmente em repouso. Em um dado instante, observa-se que as duas bolas colidem. De posse apenas dessas informações, qual das opções a seguir pode representar as velocidades $\vec{v}_{1f}$ e $\vec{v}_{2f}$ das bolas 1 e 2 após a colisão?
- (a) $\vec{v}_{1f} = 0$ e $\vec{v}_{2f} = \frac{v_0}{2} \hat{i}$
- (b) $\vec{v}_{1f} = v_0 \hat{j}$ e $\vec{v}_{2f} = -\frac{v_0}{2} \hat{i}$
- (c) $\vec{v}_{1f} = \frac{v_0}{2} \hat{i}$ e $\vec{v}_{2f} = 0$
- (d) $\vec{v}_{1f} = \frac{v_0}{2} \hat{i} + \frac{v_0}{2} \hat{j}$ e $\vec{v}_{2f} = \frac{v_0}{2} \hat{i} - \frac{v_0}{4} \hat{j}$
- (e) $\vec{v}_{1f} = \frac{v_0}{2} \hat{i} - \frac{v_0}{2} \hat{j}$ e $\vec{v}_{2f} = \frac{v_0}{4} \hat{i} + \frac{v_0}{2} \hat{j}$
12. Duas partículas A e B de massas $m_A = 0,5$ kg e $m_B = 1,5$ kg, com velocidades iniciais perpendiculares dadas no sistema de eixos coordenados

indicado na figura por $\vec{v}_A = 4\hat{i}$ e $\vec{v}_B = 4\hat{j}$ (expressos em m/s) colidem de forma totalmente inelástica.

A velocidade final $\vec{u}$ das duas partículas (em m/s) após a colisão vale:

- (a) $\vec{u} = \hat{i} + 3\hat{j}$, e a energia cinética do sistema diminuiu.
 - (b) $\vec{u} = \hat{i} + 3\hat{j}$, e a energia cinética do sistema aumentou.
 - (c) $\vec{u} = 3\hat{i} + \hat{j}$, e a energia cinética do sistema diminuiu.
 - (d) $\vec{u} = 3\hat{i} + \hat{j}$, e a energia cinética do sistema aumentou.
 - (e) $\vec{u} = \hat{i} + 3\hat{j}$, e a energia cinética do sistema não se alterou.
13. (UFPE) Uma bala de massa $m = 20$ g e velocidade $v = 500$ m/s atinge um bloco de massa $M = 480$ g e velocidade $V = 10$ m/s, que se move em sentido contrário sobre uma superfície horizontal sem atrito. A bala fica alojada no bloco. O módulo da velocidade do conjunto (bloco + bala), em m/s, após a colisão é
- a) 10,4
 - b) 14,1
 - c) 18,3
 - d) 22,0
 - e) 26,5
14. Uma bola verde de massa 2,0 kg colide com outra bola vermelha de massa 2,0 kg e mesma dimensão que a verde. A velocidade da bola verde antes do choque é V . A bola vermelha está inicialmente em repouso. A colisão pode ser considerada como perfeitamente elástica e unidimensional. A velocidade da bola vermelha após a colisão é:

- (a) igual a V
- (b) metade de V
- (c) dobro de V
- (d) zero

15. Perto de uma esquina, um pipoqueiro, P , e um “dogueiro”, D , empurram distraidamente seus carrinhos, com a mesma velocidade (em módulo), sendo que o carrinho do “dogueiro” tem o triplo da massa do carrinho do pipoqueiro. Na esquina, eles colidem (em O) e os carrinhos se engancham, em um choque totalmente inelástico. Uma trajetória possível dos dois carrinhos, após a colisão, é compatível com a indicada por

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D
- e) E

Respostas

Observação: Para o gabarito das questões objetivas ou dúvidas com relação a resolução consultem os monitores!

1. -
2. $m_1 = \frac{(m_3 v_3 - m_2 v_2)}{(v_2 - v_3)}$
 $v = \frac{0.5[(m_3 - 2m_2)v_3 + m_2 v_2]}{(m_3 v_3 - m_2 v_2)}$
3. $v_{nf} = \frac{(m_n - m_C)}{m_n + m_C} v_{ni}$
 $f_{Ecn} = 4 \frac{m_c m_n}{(m_n + m_C)^2}$
4. $\vec{v}_f = \frac{8}{3} \vec{v}_1$
5. $v_{1i} = \frac{m_1 + m_2}{m_1} \sqrt{2gh}$
6. -
7. -
8. -
9. $v_c = 75$ km/h. A afirmação não é verdadeira
10. a) $\vec{v} = 0.95 \hat{j}$ m/s
b) Sim, pois a energia se conserva (verifique matematicamente)
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -